

Gebietsimpressionen (Stand: 2011; Quelle: Planungsbüro Höllgärtner) aus dem

**FFH-Gebiet „Rheinniederung Speyer - Ludwigshafen“**



stark verlandeter Altarm mit Dominanzbeständen der Sumpf-Schwertlilie (*Iris pseudacorus*) bei Niedrigwasser im Frühjahr 2011, Altrip



Altarm mit Resten von Weich- und Hartholzauen (LRT 91E0\*, 91F0) und Treibholzresten vom letzten Hochwasserereignis



Altarm mit angrenzendem Hybridpappelbestand, mit blühender Wildbirne



Stromtalwiesen im Böllenwörth mit locker stehenden Schwarzpappelgruppen



Schwarzpappel in einer Stromtalwiese des Bollenwörths mit den charakteristischen Stammmerkmalen



Charakterpflanze der Pfeifengraswiesen (LRT 6410) im Böllenwörth: *Melampyrum cristatum*, Kamm-Wachtelweizen



Kiessee (LRT 3150) mit Makrophytenvegetation im Böllenwörth



Alteichenbestand im Böllenwörth, Zentrum des Mittelspechtvorkommens





alte Schwarzpappel (Stammdurchmesser 120 cm) im Böllenwörth



Schwarzspechthöhlen in Buche, Angelwald (LRT 9130)



locker mit Hybridpappeln bestockte Wiese mit Stromtalwiesenpotenzial (LRT 6410) bei Speyer



Rheinhauptdeich und angrenzende Hartholzaue, eichendominiert, Lebensraum des Mittelspechts



Waldkiefernbestände in den Hartholzauen des Böllenwörths, Nistplätze von Greifvogelarten



Insel im Otterstadter Altrhein mit Hybridpappelauwäldern (Potenzial für den LRT 91F0)