

Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet „Wiltinger Wald“



Abb. 1: Tal des Ockfenerbaches bei „Auf dem langen Bruch“



Abb. 2: Magere Flachland-Mähwiese (FFH-LRT 6510) am Giebelsberg



Abb. 3: Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (FFH-LRT 9160) als mittelwaldartiger Bestand, sekundär auf wechselfeuchtem Buchenwaldstandort im Plitschbachtal



Abb. 4: Niederwald am Scharfenberg



Abb. 5: Ockfenerbach (FFH-LRT 3260) bei „Auf dem langen Bruch“



Abb. 6: Ockfener Bach (FFH-LRT 3260) mit Erlenwaldresten (FFH-LRT 91E0*) bei „In der Schiffelswies“



Abb. 7: Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (FFH-LRT 8220) am Scharfenberg



Abb. 8: Tal des Ockfenerbaches vom Ockfener Berg



Abb. 9: Schluchtwald auf Hangschutt (FFH-LRT 9180*) im unteren Talabschnitt des Weidenbaches



Abb. 10: Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation (FFH-LRT 8220) am Zusammenfluss von Ockfenerbach und Weidenbach



Abb. 11: Tal des oberen Ockfenerbaches



Abb. 12: Durchgewachsener Niederwald am Wilhelmskopf



Abb. 13: Röhricht im Tal des oberen Ockfenerbaches



Abb. 14: Magere Flachland-Mähwiese (FFH-LRT 6510) westlich Vierherrenborn



Abb. 14: Nahaufnahme der mageren Flachland-Mähwiese (FFH-LRT 6510) westlich Vierherrenborn mit Knöllchen-Steinbrech (*Saxifraga granulata*)